

Lerasept® VET 300

Desinfektionsmittel mit drei Wirkstoffen und MG-Aktivator

Lerasept® VET 300 ist ein formaldehydfreies Breitband-Flächendesinfektionsmittel für den Veterinärbereich mit leistungsstarken, oberflächenaktiven Wirkstoffen und ausgeprägter Tiefenwirkung. Es wird für die Routinedesinfektion von Tierställen, Stalleinrichtungen und Gerätschaften sowie für Transportfahrzeuge eingesetzt. Lerasept® VET 300 kann auch zur Bodenreinigung und -desinfektion in tierärztlichen Einrichtungen und Kliniken verwendet werden. Es ist wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren, unter anderem gegen das Afrikanische Schweinepestvirus (ASP) und die Vogelgrippe (Influenza Virus H5N2).

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für in der Landwirtschaft übliche Metall- und Kunststoffoberflächen.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

1. Oberflächendesinfektion durch Sprühen oder Schäumen im Veterinärbereich (PT3)

Lerasept® VET 300 wird zur Desinfektion von harten porösen und glatten Oberflächen, wie Böden und Wänden von Tierbehausungen eingesetzt. Die Anwendung erfolgt mittels Sprühlanzen, Sprühanlagen, herkömmlicher Spritzen oder auch Schaumgeräten. Die zu behandelnden Flächen müssen gut gereinigt und möglichst trocken sein. Nach der Anwendung ist eine Nachspülung erforderlich.

Einsatzmenge: 100 ml/m²

Einsatzmenge im Seuchenfall: 400 ml/m²

2. Desinfektion von Equipment durch manuelles sprühen oder schäumen (PT3)

Lerasept® VET 300 Anwendungsverdünnung kann mit manuellen Sprühsystem, Sprühlanzen oder Schaumsystemen angewendet werden.

Die zu behandelnden Oberflächen müssen gut gereinigt und so trocken wie möglich sein.

Nach der Anwendung ist eine Nachspülung erforderlich.

Einsatzmenge: 100 ml/m²

Einsatzmenge im Seuchenfall: 400 ml/m²

3. Desinfektion von Tiertransportern (PT3)

Lerasept® VET 300 wird nach dem Transport der Tiere und einer Vorreinigung Außen und Innen zur Desinfektion eingesetzt.

Die Anwendungsverdünnung beträgt 3 % (v/v) für die Anwendung auf Außenflächen und 3,5 % (v/v) für Innenflächen einschließlich poröser Oberflächen.

Anschließend Sicherstellen, dass die Oberfläche für die entsprechende Einwirkzeit (5 Minuten außen, 30 Minuten innen) feucht bleibt, dann mit Wasser abspülen.

Einsatzmenge: 100 ml/m²

Einsatzmenge im Seuchenfall: 400 ml/m²

4. Desinfektion von Stiefeln im Veterinärbereich (PT3)

Lerasept® VET 300 wird zur Desinfektion von Stiefeln in Durchlaufbädern verwendet. Durchlaufbäder werden an den Ein- und Ausgängen von Tierhaltungsräumen aufgestellt. Die Durchlaufbäder werden mit Wasser befüllt,

anschließend wird Lerasept® VET 300 hinzugefügt, um eine wirksame Konzentration von 3,5 % zu erreichen.


Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Biocides

biocides@stockmeier.com

+49 521 / 3037- 0



Kategorie

- Biozid

pH-Wert

- Schwach sauer

Aktivsubstanz

- Glutaral
- QAV

Wirksamkeit

- Bakterizid
- Levurozid
- Viruzid

Aggregatzustand

- Flüssigkeit

Konformität

- IHO
- DVG

Zertifizierungen

- Halal

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG

Am Stadtholz 37

Bielefeld

www.stockmeier.com

Lerasept® VET 300

5. Oberflächendesinfektion im Gesundheitsbereich (PT2)

Lerasept® VET 300 wird auch zur Desinfektion von harten Oberflächen, Böden und Wänden in tierärztlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Seniorenresidenzen etc. verwendet. Das Produkt mit Wasser zu einer 0,5 %igen Anwendungslösung verdünnen. Die Anwendung der Verdünnung erfolgt mit einem Triggersprüher. Nach 30 Minuten Einwirkzeit müssen die Oberflächen mit Wasser abgespült werden.

Einsatzmenge: 50 ml/m² Lerasept® VET 300 Verdünnung

Gutachten nach DIN EN 1656, 1657, 13624, 13697, 13727, 14349, 14675, 16438, 17122 gemäß DVG-Prüfrichtlinien liegen vor.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Registrierung

Dänemark	PR nr. 4397923
Deutschland	BAuA: N-102199
Frankreich	N°Inventaire: 67289
Österreich	registriert
Polen	7981/20
Serbien	registriert
Slowakei	bio/3844/D/21/CCHLP
Griechenland	Αρ. πρωτ. Ε.Ο.Φ: 26222/01-03-2024/ΑΠ-1671
Republik Moldau	P-0183/2024

Wichtige Inhaltsstoffe

Glutaral (11 g/100 g), Benzyl(C12-16)-alkyldimethylammoniumchlorid (8 g/100 g), Dicyldimethylammoniumchlorid (3,5 g/100 g), Tenside, Stabilisatoren

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	klare Flüssigkeit
pH-Wert	3,0 - 6,0
Dichte (20°C)	1,010 - 1,060 g/cm ³

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitze einwirkung schützen.

Evtl. zu viel entnommenes Produkt darf niemals in das Originalgebinde zurückgefüllt werden.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.



Lerasept® VET 300

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidsplatt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt: Behandlung entsprechend den Symptomen empfohlen.

Wirksamkeiten

Keim	Temperatur	Zeit	Verunreinigung	Anwendung
1. Oberflächendesinfektion durch Sprühen oder Schäumen im Veterinärbereich (PT3)				
Bakterien	10°C	30 Min.	gering	2,5% Produkt ± 250 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Hefen	10°C	30 Min.	gering	3,5% Produkt ± 350 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Listerien und Salmonellen	10°C	30 Min.	gering	0,3% Produkt ± 30 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Bakterien, vorbeugende Desinfektion nach DVG	10°C	120 Min.	gering	1% Produkt ± 100 ml auf 10 l Wasser verdünnen, Einsatzmenge 400 ml pro m ²
behüllte Viren nach DVG	10°C	60 Min.	gering	3% Produkt ± 300 ml auf 10 l Wasser verdünnen, Einsatzmenge 400 ml pro m ²
ECBO Virus	10°C	30 Min.	gering	0,75% Produkt ± 75 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Parvovirus	10°C	120 Min.	gering	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Influenza virus H5N2	10°C	30 Min.	gering	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Afrikanischer Schweinepestvirus	10°C	30 Min.	gering	0,1% Produkt ± 10 ml auf 10 l Wasser verdünnen
2. Desinfektion von Equipment durch manuelles sprühen oder schäumen (PT3)				
Bakterien, Hefen	10°C	30 Min.	gering	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
ECBO Virus	10°C	30 Min.	gering	0,75% Produkt ± 75 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Parvovirus	10°C	120 Min.	gering	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
3. Desinfektion von Tiertransportern (PT3)				
Bakterien, Hefen	10°C	5 Min.	gering	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Viren	10°C	5 Min.	gering	3% Produkt ± 300 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Bakterien, Hefen, Viren	10°C	30 Min.	gering	3,5% Produkt ± 350 ml auf 10 l Wasser verdünnen
4. Desinfektion von Stiefeln im Veterinärbereich (PT3)				
Bakterien, Hefen	10°C	1 Min.	gering	3,0% Produkt ± 300 ml auf 10 l Wasser verdünnen
5. Oberflächendesinfektion im Tiermedizinischen-Gesundheitsbereich (PT2)				
Bakterien, Hefen	20°C	30 Min.	hoch	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
 Am Stadtholz 37
 Bielefeld
www.stockmeier.com